



Crna Gora
Ministarstvo zdravlja

*Nacionalna komisija za kvalitet i
bezbjednost zdravstvene zaštite*

PREPORUKE ZA LIJEČENJE AGRESIVNIH LIMFOMA

Podgorica, maj 2019. godine

PREPORUKE ZA LIJEČENJE AGRESIVNIH LIMFOMA- PREDSTAVNIK DIFUZNI B KRUPNOĆELIJSKI LIMFOM

Prva terapijska linija

1. Bolesnici mlađi od 60 godina

R-CHOP protokol (rituksimab, ciklofosamid, doksorubicin, vinkristin, pronison)+radioterapija na lokalizaciju *bulky* bolesti; R-CHOEP protokol (R-CHOP+etoposid) + visokodozna hemioterapija i autologa TMČH kod visokorizičnih bolesnika

2. Bolesnici od 60-80 godina

a) Bez značajnih komorbiditeta

R-CHOP+ radioterapija na lokalizaciju *bulky bolesti*

b) Sa komorbiditetima

R-CEOP (rituksimab, ciklofosamid, etopozid, vinkristin, pronison), R-COP (rituksimab, ciklofosamid, vinkristin), palijativna terapija

3. Bolesnici preko 80 godina

a) Bez značajnih komorbiditeta

R-miniCHOP (redukovane doze CHOP sa rituksimabom)

b) Sa komorbiditetima

R-CEOP, R-COP

Liječenje relapsa

1. Mlađi od 65-70 godina

a) *Fit*

DHAP (deksametazon, citarabin, cisplatin), ICE (ifosfamid, karboplatin, etopozid), ESHAP (etopozid, methylprednizolon, citarabin, cisplatin) +upućivanje na visokodoznu hemioterapiju i autologu transplantaciju matične ćelije hematopoeze

b) *Unfit*

CEOP, citarabin+etopozid, etopozid

2. Stariji od 70

CEOP, citarabin, etopozid